# ZALECENIA PRZED BADANIEM W ZNIECZULENIU OGÓLNYM DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

| | **DZIEŃ PRZED BADANIEM** | | | **DZIEŃ BADANIA** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *RANO* | *POŁUDNIE* | *WIECZÓR* | *RANO* | *POŁUDNIE* | *WIECZÓR* |
| LEKI DOUSTNE | Normalna dawka | Normalna dawka | Bez leku | Bez leku | Normalna dawka | Normalna dawka |
| LEKI DOUSTNE + INSULINA | Lek doustny - normalna dawka, 1/2 dawki insuliny długodziałającej | Bez leku doustnego i insuliny długodziałającej | Bez leku doustnego i insuliny długodziałającej | Bez leku doustnego, normalna dawka insuliny długodziałającej | | |
| INSULINA - DWA WSTRZYKNIĘCIA DZIENNIE | 1/2 dawki | | Bez leku | Bez leku przed, normalna dawka po badaniu | | Normalna dawka |
| INSULINA - CZTERY WSTRZYKNIĘCIA DZIENNIE | Normalna dawka | | 1/2 dawki | Bez leku przed, 1/2 dawki po badaniu | Normalne dawki | |
| **Badaniu pacjentów z cukrzycą rano!** Monitorowanie glikemii w przeddzień i w dniu badania - co 4 godziny | | | | | | |